

【参考】症状例 登園を控えるおおまかな目安

(医師から感染の恐れがないと診断されるまでは保育を控えることが望ましいが、医学的な証明は現実的には困難である為、児童の状態により個別判断が必要である。)

	登園を控えるのが望ましい場合 (□にチェック☑をいれる)
発熱 (個々の平熱により個別に判断が必要)	<input type="checkbox"/> 医師より登園を控えるよう指示された場合 <input type="checkbox"/> 発熱期間と同日の回復期間が経過していない <input type="checkbox"/> 朝から37.5℃を超えた熱とともに元気がなく機嫌が悪い <input type="checkbox"/> 食欲がなく朝食・水分が摂れていない <input type="checkbox"/> 24時間以内に38℃以上の熱が出ていた、もしくは解熱剤を使用している <input type="checkbox"/> 1歳以下の乳児の場合(上記にプラスして)、平熱より1℃以上高いとき(38℃以上あるとき)
下痢	<input type="checkbox"/> 医師より登園を控えるよう指示された場合 <input type="checkbox"/> 24時間以内に2回以上の水様便がある <input type="checkbox"/> 食事や水分を摂ると下痢がある(1日に4回以上の下痢) <input type="checkbox"/> 下痢に伴い、体温がいつもより高めである <input type="checkbox"/> 朝、排尿がない(おしっこがでない) <input type="checkbox"/> 機嫌が悪く、元気がない <input type="checkbox"/> 顔色が悪くぐったりしている
嘔吐	<input type="checkbox"/> 医師より登園を控えるよう指示された場合 <input type="checkbox"/> 24時間以内に2回以上の嘔吐がある <input type="checkbox"/> 嘔吐に伴い、いつもより体温が高めである <input type="checkbox"/> 食欲がなく、水分もほしがらない <input type="checkbox"/> 機嫌が悪く、元気がない <input type="checkbox"/> 顔色が悪くぐったりしている
咳	<input type="checkbox"/> 医師より登園を控えるよう指示された場合 ※ 前日に熱がなくても <input type="checkbox"/> 夜中しばしば咳のために起きる <input type="checkbox"/> 喘鳴(ゼイゼイ)や呼吸困難がある <input type="checkbox"/> 呼吸が速い <input type="checkbox"/> 37.5℃以上の熱を伴っている <input type="checkbox"/> 元気がなく機嫌が悪い <input type="checkbox"/> 食欲がなく朝食・水分が摂れない <input type="checkbox"/> 少し動いただけで咳がでる
発しん (皮膚症状)	<input type="checkbox"/> 医師より登園を控えるよう指示された場合 <input type="checkbox"/> 発熱とともに発しんのあるとき <input type="checkbox"/> 今までになかった発しんが出て、感染症が疑われるとき <input type="checkbox"/> 口内炎のため食事や水分が摂れないとき <input type="checkbox"/> とびひ(伝染性膿痂疹)の場合、患部を覆えないとき・浸出液(ジュクジュク)が多く他児への感染の恐れがあるとき・かゆみが強く手で患部を掻いていしまうとき